アップニーク問診票、同意書

１．急にまぶたが下がった：　はい　　いいえ
（急な眼瞼下垂は、脳神経内科や脳神経外科を受診して下さい）

２．平均で、1mm のまぶたを上げる効果があります。84%の人が5 分後から 8 時間、まぶたの上がり方に効果を感じます。
88%の人が上方視野の改善を感じます。効果が切れれば、まぶたは元通りに下がります。以上を御了承下さい。　　はい　　いいえ

３．アップニークの使用により、散瞳が生じる可能性があります。散瞳が生じた場合には、その症状が回復するまでは自転車・自動車等の運転、機械類の操作は避けて下さい。　　はい　　いいえ

４．妊婦、授乳婦、小児には使用出来ません。
心血管系疾患：血圧及び脈拍数の変動する可能性があります。
閉塞隅角緑内障：急性閉塞隅角緑内障の発作の可能性があります。
以上を御了承下さい。　　はい　　いいえ

５．アップニークは、返品、返金出来ません。
以上を御了承下さい。　　はい　　いいえ

６．日中に出られる電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

年　　月　　日　名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿